

PRODUCTO
ALACRAMYN Faboterápico Polivalente Antialacrán

Antídotos





Antivipmyn (Antídoto Faboterápico Polivalente)

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

ALACRAMYN® liofilizado para solución inyectable, se presenta en caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente.

Cada frasco ampula con liofilizado contiene:

Faboterápico® polivalente antialacrán con una capacidad neutralizante de 150 DL50 (1.8 mg) de veneno de alacranes americanos.

Cada ampolleta con diluyente contiene:

Solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml

INDICACIONES TERAPÉUTICAS

ALACRAMYN® Faboterápico® polivalente antialacrán, indicado para el tratamiento del envenenamiento por picadura de alacrán.

CONTRAINDICACIONES

Casos conocidos de alergia a proteínas de caballo.

PRECAUCIONES GENERALES

En zonas donde hay muchos alacranes es válido administrar ALACRAMYN® en caso de sospecha de intoxicación con base en el cuadro clínico aun cuando no se haya observado el alacrán.

La vía de administración ideal es intravenosa. La administración de ALACRAMYN® por vía intramuscular disminuye su efectividad.

La dosis en niños tiende a ser mayor que en los adultos, debido a la concentración del veneno más elevada en ellos, por ser más pequeños y pesar menos que el adulto.

La intoxicación por picadura de alacrán es una urgencia, por ello, el paciente debe ser evaluado por un médico. No administre ningún líquido ni alimento por vía oral al paciente intoxicado. ALACRAMYN® es el tratamiento específico; el médico deberá evaluar la necesidad de utilizar terapia de sostén como: aplicación de oxígeno, hidratación por vía intravenosa, analgésicos, toxoide tetánico, etc.

No está preestablecido un límite máximo de dosis, se deberán aplicar las necesarias para neutralizar el veneno.

| Grado de intoxicación | Grupo de síntomas y signos | Dosis de edad |
|--------------------------------|---|--|
| Leve o grado I | Dolor local, parestesias locales y a distancia, prurito nasal y faringeo. | Cualquier edad |
| Moderado o grado II | Signos y síntomas del cuadro leve más sensación de cuerpo extraño o de obstrucción en la orofaringe y sialorrea, diaforesis, nistagmus, fasciculaciones linguales, disnea, distensión abdominal, priapismo y espasmos musculares. | Menor de 15 años 2 frascos I.V. Mayor de 15 años 1 frasco I.V. |
| Severo o grado III | Signos y síntomas del cuadro moderado más taquicardia, hipertensión, visión de halos rojos, ceguera transitoria, vómito, nistagmus, dolor retroesternal, edema agudo pulmonar e insuficiencia respiratoria. | Menor de 15 años 3 frascos I.V. Mayor de 15 años 2 frascos I.V. |

PRESENTACIÓN

Caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente.

RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

No requiere refrigeración. Conserve a no más de 37°C.