

PRODUCTO
ANTIVIPMYN Antídoto Faboterápico Polivalente

Antídotos





Antivipmyn (Antídoto Faboterápico Polivalente)

FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Se presenta en caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente.

Cada frasco ampula con liofilizado contiene:

Faboterápico® polivalente antiviperino con capacidad neutralizante de 780 DL50 de veneno deshidratado de Bothrops sp y 790 DL50 de veneno deshidratado de Crotalus sp.

Cada ampolleta con diluyente contiene:

Solución isotónica de cloruro de sodio..... 10 ml.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

La vía de administración es intravenosa.

Reconstitución para su aplicación:

Prepare los frascos ampula que requiere el paciente de la siguiente manera:

1. Retire la tapa Flip-off del frasco ampula .
2. Con un algodón humedecido con alcohol, limpie el tapón de hule que queda al descubierto.
3. Abra la ampolleta con el diluyente y con una jeringa y aguja estéril (se recomienda una jeringa con capacidad de 10 ml), saque el líquido contenido e inyéctelo en el frasco ampula a través del tapón de hule.
4. Retire la jeringa del frasco ampula.
5. Agite suavemente con movimientos rotatorios hasta disolver completamente la pastilla. Evite agitación vigorosa o prolongada. Debido al contenido proteico del antiveneno, se puede formar espuma durante el proceso de reconstitución. La solución debe ser translúcida o ligeramente opalescente.
6. Vuelva a introducir la aguja con la jeringa en el tapón de hule del frasco ampula, y saque la totalidad de la solución contenida en el frasco ampula.
7. Una vez extraída la solución del frasco ampula, retire la aguja con la jeringa del frasco ampula.
8. Repita los pasos anteriores para abrir y preparar los frascos de que se requieran.
9. Afore reconstituido a 250 ml de solución fisiológica y adminístrelo en 30 minutos aproximadamente.
10. Para la administración de las dosis de sostén repita el procedimiento. De acuerdo con el grado de intoxicación se sugiere el siguiente esquema posológico:

Grado de envenenamiento	Síntomas y signos	Adultos		Niños	
		Dosis inicial	Dosis de sostén	Dosis inicial	Dosis de sostén
Sospecha Grado 1 o Leve	Antecedente de haber sido mordido recientemente por una víbora, huellas de colmillos y dolor local. Antecedente de haber sido mordido recientemente, por una víbora, huellas de colmillos, hemorragia por los orificios de la mordedura, alrededor del área mordida hay dolor, edema de 10cm o menos de diámetro en el miembro afectado.	Observaciones			
		3 a 5 frascos I.V.	5 frascos I.V.	6 a 10 frascos I.V.	5 frascos I.V.
Grado de envenenamiento	Síntomas y signos	Adultos		Niños	
		Dosis inicial	Dosis de sostén	Dosis inicial	Dosis de sostén
Grado II o moderado	Mismo cuadro del grado I más acentuado y además edema de 10cm o más en el área afectada, náusea, vómito, flictemas con contenido seroso o sanguinolento oliguria leve. De contar con laboratorio, las determinaciones de CPK, creatinina sérica, tiempo de coagulación, protrombina y tromboplastina están elevadas; hipofibrinogenemia, trombocitopenia y gases arteriales están alterados.	Observaciones			
		6 a 10 frascos I.V.	5 frascos I.V.	15 frascos I.V.	5 frascos I.V.
Grado III o severo	Mismo cuadro 2 pero más acentuado y además tejido necrosado en el miembro o área mordida, dolor abdominal, bulas, mionecrosis, parestesias, oliguria marcada, hemorragia por vía bucal y/o rectal, hemoptisis hematuria y las pruebas de laboratorio muy alteradas.	11 a 15 frascos I.V.	6 a 8 frascos I.V.	20 a 30 frascos I.V.	10 a 15 frascos I.V.
Grado IV o muy severo	Mismo cuadro grado 3 más acentuado y se acompaña de choque, disfunción orgánica múltiple y coma.	16 o más frascos I.V.	8 o más frascos I.V.	31 o más frascos I.V.	16 o más frascos I.V.