

PRODUCTO  
**CORALMYN** Fabiterápico Polivalente Anticoral

Antídotos





## Coralmyn (Fabiterápico polivalente anticoral)

### FORMA FARMACÉUTICA Y FORMULACIÓN

Coralmyn® liofilizado para solución inyectable, se presenta en caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con diluyente.

Cada frasco ampula con liofilizado contiene:

Faboterápico® polivalente anticoral modificado por digestión enzimática y libre de albúmina con una capacidad neutralizante de 450 DL<sub>50</sub> (5 mg) de veneno deshidratado de coral o coralillo

Cada ampolleta con diluyente contiene:

Solución isotónica de cloruro de sodio 5 ml

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS

**CORALMYN** faboterápico polivalente anticoral, indicado para el tratamiento del envenenamiento pormordedura de:

**Micrurus sp.** (coral, coralillo de sonora, coral anillado, coral de canulos, coral punteado, etc.)

### CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad conocida a proteínas de origen heterólogo.

### PRECAUCIONES GENERALES

La presencia de uno o más de los siguientes síntomas o signos

- Huellas de colmillos
- Dolor y edema de intensidad variable en el sitio de la mordedura.
- Astenia, adinamia.
- Oftalmoplejia, visión borrosa.
- Ptosis palpebral.

● Datos de insuficiencia respiratoria de grado diverso y otros más denota la existencia de una intoxicación por mordedura de coral o coralillo, se recomienda iniciar la administración de **CORALMYN**.

Grado de intoxicación	Grupo de síntomas y signos	Adultos		Niños	
		Dosis inicial	Dosis inicial	Dosis inicial	Dosis inicial
<b>Grado I o Leve</b>	Antecedentes de haber sido mordido recientemente, por una vibora, huellas de colmillos, alrededor del área mordida hay dolor, edema, hemorragia por orificios de la mordedura, parestesias en el miembro afectado o área mordida.	<b>2 frascos I.V.</b>	<b>2 o más frascos I.V.</b>	<b>2 a 3 frascos I.V.</b>	<b>3 o más frascos I.V.</b>
<b>Grado II o Moderado</b>	Mismo cuadro del grado I más acentuado y además se presenta en el área afectada entre 30 minutos a 2 horas. e incluso llegar a 15 horas postmordida, edema, astenia, adinamia, ptosis palpebral, oftalmoplejia, visión borrosa, diplopia, dificultad para respirar.	<b>5 frascos I.V.</b>	<b>5 o más frascos I.V.</b>	<b>5 a 6 frascos I.V.</b>	<b>6 o más frascos I.V.</b>
<b>Severo o grado III</b>	Mismo cuadro grado 2 más acentuado y además trastorno del equilibrio, dolor en maxilar inferior, disfagia, sialorrea, voz débil, ausencia de reflejos parálisis flácida, gran dificultad para respirar que puede conducir a paro respiratorio y coma.	<b>8 frascos I.V.</b>	<b>8 o más frascos I.V.</b>	<b>8 a 9 frascos I.V.</b>	<b>9 o más frascos I.V.</b>

### PRESENTACIÓN

Caja con frasco ampula con liofilizado y ampolleta con 5 ml de diluyente.

### RECOMENDACIONES SOBRE ALMACENAMIENTO

No requiere refrigeración. Conserve a no más de 37°C.